AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP13-6-68798803

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE: 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

ABONNEMENT ANNUEL

25 F.

Tél. 34-14-63 - Poste 93
(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES) MEUSE
Régicseur de récettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative. 2, Rue de l'Hôpital Militaire
67 STRASBOURG
C. C. P.: STRASBOURG 55-08-86

30 Mai 1968

Supplément n° 4 au Bulletin du mois de Mai 1968

Avertissement

VIGNE

MILDIOU

Les précipitations orageuses qui se sont produites ces jours derniers, ont été à l'origine des contaminations primaires et des taches de Mildiou apparaîtront isolément d'ici quelques jours.

En conséquence, il est nécessaire d'exécuter un traitement fongicide soigné, dans la période du 31 Mai au 3 Juin inclus, de façon à empêcher toute extension possible de la maladie.

VERS DE LA GRAPPE (Cochylis - Eudémis - 1ère génération)

L'activité des papillons de Tordeuses de la grappe (1ère génération) a été relativement faible dans l'ensemble, à l'exception cependant du vignoble de COLMAR et de SIGOLSHEIM où les prises en pots de capture ont été plus nombreuses. Un traitement préventif ne peut actuellement se justifier que dans les expositions les plus sujettes aux Vers de la grappe. On opèrera en traitement mixte, en choisissant une spécialité insecticide à base d'un des produits figurant sur la liste en votre possession.

Dans la plupart des secteurs où les vols sont encore très faibles, la lutte pourra éventuellement être réalisée ultérieurement avec utilisation d'un produit curatif (Parathion notamment). Un avis indiquera la date de ce traitement curatif.

OIDIUM

Le traitement conseillé le 14 Mai devrait être renouvelé dans les premiers jours de Juin. On opèrera en pulvérisation sous forme de traitement mixte, combiné avec celui dirigé contre le Mildiou.

427

•••/•••

GRANDE CULTURE

POMMES DE TERRE

MILDIOU (Région des cultures de primeurs du département du HAUT-RHIN zone irriguée de la HARDT).

Un traitement fongicide préventif devra être exécuté dès réception. Pour le choix des produits, se reporter à la liste en votre possession.

FEVEROLES

PUCERONS

Les premières colonies de Pucerons ayant fait leur apparition dans les cultures de féveroles, il est conseillé d'intervenir au plus tôt avec l'un des aphicides figurant sur la liste en votre possession. Des précautions sont à prendre au moment de la floraison pour éviter les empoisonnements d'abeilles (voir dispositions légales à ce sujet).

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles : J. BERNARD et C. GACHON

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station ALSACE et LORRAINE / Directeur-Gérant : L. BOUYX.

east not the light fue he segmined to retry on study or having and then

would be a state of the later of the braid of the ball to be the ball of the ball of